

同意書

トライビームトローニング

- トライビームトローニングは、低出力のレーザーを顔全体に照射することで、メラニン色素を徐々に減らし、お肌のトーンアップ、ブライティング効果があります。肝斑や炎症後色素沈着の改善に効果的な治療です。
 - レーザー照射後は日常的なスキンケアを行い、保湿を十分におこなってください。日焼けや、肌への刺激を加えると色素沈着を生じる可能性があります。※日焼けの状態によってはレーザー照射を延期する場合がございますのでご了承ください。肌へのマッサージやピーリング等は避けて下さい。
 - 治療効果や治療回数には個人差があり、治療完了後に、再発することもあります。予めご了承ください。次回の治療の際には、指示した施術間隔を守っていただくようお願いいたします。
 - レーザー照射後に赤み、腫れ、毛嚢炎、水泡などのやけど、炎症後色素沈着、色素脱失、硬毛化などを起こす場合があります。他院でレーザーを受けられて、上記のような症状が出たことがある方は事前にお申し出下さい。炎症後色素沈着は、場合によってはもとのシミより濃くなる場合があります、3～6ヶ月程度かけて徐々に改善してくることが多いですが、稀に残ってしまう場合もあります。
 - 残しておきたいホクロがある場合は施術前に看護師にお申し出下さい。
 - 下記に該当する方、既往歴・現病歴、現在内服中のお薬があれば必ず事前にお申し出をお願いいたします。
 - 禁忌：リウマチ治療にて金製剤による治療歴がある方、光アレルギーの方、過度な日焼けをされている方、尋常性白斑の方、妊娠中の方、てんかん・癌・感染症を持病にお持ちの方、金の糸が入っている方は施術をお断りしております。治療部位に傷や皮膚腫瘍がある方、ペースメーカーや除細動器を入れている方、金属やシリコンがある方は治療がお受けできません。
 - 要相談：日焼けをされた方(スキントーンが暗い方)、お肌の乾燥が強い方、心臓疾患のある方、出血性疾患のある方、糖尿病の方、ケロイド体質の方、単純ヘルペスの活動病変がある方、授乳中の方、リウマチの既往歴がある方は治療が受けられない場合があります。
- ※ 授乳中の方は、トラブルが起きた際に内服薬の制限があるため出力を上げられない場合があります。
- ※ レーザーや医療機器はいずれも精密機器です。万が一、機器にトラブルがあった際には、同日に治療を受けていただけない場合がございますのでご了承ください。
- ※ 施術ご案内用紙の内容も併せてご参照いただき、施術後の注意事項の厳守をよろしくをお願いいたします。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

○本人(18歳未満の場合は法定代理人欄の両方に署名が必要です)

年 月 日 氏名

○法定代理人(親権者・後見人・保護義務者)あるいは保証人

年 月 日 氏名

(続柄)